L'activité en fonction de la dilution, la force ionique, la complexation : comment décrire ces phénomènes ?

Claude-Gilles DUSSAP, Oumar TOURE et André LEBERT

Institut Pascal - Axe Génie des Procédés, Energétique et Biosystèmes
UMR CNRS 6602 - Université Blaise Pascal

Appliquer à des milieux biologiques et alimentaires des modèles de solutions couramment utilisés en génie chimique.

- avec de l'eau « presque » toujours
- avec des électrolytes (faibles et forts) systématiquement
- des équilibres chimiques complexes
- des solutés organiques variés

Nécessité d'une approche prédictive, incluant:

- les écarts par rapport aux situations de référence (coefficients d'activité)
- la prise en compte des équilibres chimiques: dissociation, complexation, hydratation, oxydo-réduction

I- Notions de base

- a_w , pH et pK_a
- Potentiel chimique
- Propriétés de formation d'un corps pur
- Etats de référence

II- Modèles de coefficients d'activité

- Modèle de solutions d'électrolytes : ULPDHS
- Modèle COSMO-RS
- Extensions du modèle COSMO-RS

III- Propriétés de formation

- Etats de référence
- Enthalpie de formation
- Enthalpie libre de formation
- Modélisation du pK_a

I- Notions de base

1. a_w , pH et pK_a

2. Potentiel chimique

3. Propriétés de formation d'un corps pur

4. Etats de référence

a_w , pH et pK_a (1)

5

◇ Activité d'une espèce i en solution

$$a_i = \frac{\gamma_i C_i}{C^0}$$

C_i : Concentration de l'espèce i dans le mélange

C^0 : Concentration de référence égale à 1 mol/L

γ_i : Coefficient d'activité de l'espèce i (ou écart à l'idéalité)

$i = H_2O$

$$a_i = a_w$$

Solution « idéale » sans interaction entre constituants

Solution réelle avec interactions solvant/soluté et soluté/soluté

m : molalité (mol/kg de solvant) ; X : fraction molaire

◇ Expression du pH

$$pH = -\log \left(\gamma_{H^+}^m \frac{m_{H^+}}{m_s^{H^+}} \right) \xrightarrow{m_s^{H^+} = 1 \text{ mol.kg}^{-1}} pH = -\log \left(\gamma_{H^+}^m m_{H^+} \right)$$

◇ Expression du pK_a

$$K_a = \frac{(a_{H^+} \text{ ou } a_{H_3O^+})(a_B)}{(a_A)} \xrightarrow{\hspace{1cm}} pK_a = pH + \log \left(\frac{a_A}{a_B} \right)$$

$$a_w = \gamma_{H_2O}^m m_{H_2O}$$
$$a_w = \gamma_{H_2O} X_{H_2O}$$

Influence de la force ionique sur le pK_a

◇ Expression du pK_a (en présence d'ions)

$$\begin{cases} I = \frac{1}{2} \sum_i (C_i \eta_i^2) \\ a_i = c_i f_i \end{cases}$$

$$pK_a = pK'_a + 0.51065 \sum_i (v_i \eta_i^2) \frac{\sqrt{I_m}}{1 + 1.6 \sqrt{I_m}}$$

- ◇ Expression du potentiel chimique (ou enthalpie libre molaire partielle)

$$g_i = \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, p, n_{j \neq i}} = \overset{\text{Enthalpie libre de formation dans l'état de référence}}{g_i^r} + RT \ln(\gamma_i x_i)$$

2 problématiques

- Modéliser les coefficients d'activité γ_i
- Modéliser les propriétés de formation g_i^r et h_i^r

Potentiel chimique (2)

9

- Compilation des valeurs des propriétés de formation pour des produits biologiques et alimentaires (Ould Moulaye, 1997)

➤ Nécessité de disposer de données d'enthalpies libres (ou potentiels chimiques), d'enthalpies et de capacités calorifiques fiables et cohérentes!!

Potentiel chimique (3)

10

Equilibre de dissociation

◇ Expression thermodynamique de la constante d'acidité (à DI dans l'eau)

Echelle des molalités

(A l'équilibre thermodynamique)

$$\curvearrowright \Delta g = g_{A^-}^m + g_{H^+}^m - g_{AH}^m = RT \ln \left(\frac{\gamma_{H^+}^m m_{H^+}^m \gamma_{A^-}^m m_{A^-}^m}{\gamma_{AH}^m m_{AH}^m} \right)$$

Conditions de référence :

$$\begin{cases} T_r = 25^\circ C \\ p_r = 1 \text{ atm} \\ g_{H^+r}^m = 0 \end{cases} \curvearrowright pK = \frac{1}{RT \ln 10} \left(g_{A^-r}^m - g_{AHr}^m \right)$$

Potentiel chimique (4)

11

Equilibre d'oxydo-réduction

Dans les conditions de référence

$$E^0 = -\frac{g_{e^-r}}{\mathcal{F}} = \frac{1}{n\mathcal{F}} \left(g_{oxr}^m - g_{redr}^m \right)$$

Enthalpie libre de formation du réducteur

Enthalpie libre de formation de l'oxydant

Connaissant les valeurs des coefficients d'activité (modèle ULPDHS)

$$E_{25^\circ\text{C}} = E^0 + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \left(\frac{\gamma_{ox}^m m_{ox}}{\gamma_{red}^m m_{red}} \right)$$

Propriétés de formation

12

◇ Description de l'état thermodynamique d'un corps pur

Valeurs de 2
degrés de liberté
à fixer

$$T_r = 298,15 \text{ K}$$

Calculs des autres
propriétés

$$p_r = 1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ Pa}$$

Etats de référence en
chimie quantique

$$\Delta G_f^{298,15 \text{ K}} ; \Delta H_f^{298,15 \text{ K}}$$

II- Modèles de coefficients d'activité

1. Modèle de solutions électrolytiques (ULPDHS)

2. Modèle COSMO-RS

3. Extension du modèle COSMO-RS

Modèle de solutions électrolytiques (1)

14

Hydratation d'une molécule neutre (glucose)

Hydratation des ions (Na⁺ et Cl⁻)

nombre d'hydratation (n)

Modèle COSMO-RS (1)

16

- ◇ COSMO-RS = Conductor-like Screening Model for **Real Solvents**
- ◇ 3 types d'interactions énergétiques (E_{misfit} ; E_{HB} et E_{vdW})

Modèle COSMO-RS (2)

17

Chimie quantique

Structure moléculaire

Calcul de mécanique quantique **COSMO**
(**C**onductor-like **S**creening **M**odel)

Base de données
contenant les fichiers
« **COSMO** »

Calcul de la distribution des
charges sur une molécule
individuelle

« σ -Profile » des composés

Calculs rapides de
thermodynamique statistique

« σ -Potentiel »
du mélange

Résultats: Propriétés d'équilibre du mélange (potentiels chimiques des composés, coefficients d'activités, enthalpies d'excès, enthalpies libres d'excès, pressions de vapeur, diagrammes de phase, ...)

Calculs thermodynamiques

Extension du modèle COSMO-RS (1)

18

Hydratation des cations

Extension du modèle COSMO-RS (2)

19

Espèces « apparentes »

Soluté

Eau

Espèces « vraies »

Cl⁻ libre

Na⁺ libre

Cl⁻ hydraté

Na⁺ hydraté

Eau libre

Interactions de courte portée (SR)

Utilisation de la méthode COSMO-RS

Contribution chimique (hydratation)

Interactions de longue portée (LR)

Théorie de Debye Hückel (terme PDH)

Extension du modèle COSMO-RS (3)

20

Calcul du coefficient d'activité des sels

21

Résultats obtenus avec le modèle COSMOPDHS (2)

Calcul du coefficient d'activité des sels

22

III- Propriétés de formation

1. Etats de référence

2. Modélisation de l'enthalpie de formation

3. Modélisation de l'enthalpie libre de formation

4. Modélisation du pK_a

Etats de référence (1)

24

Propriétés de formation à DI dans l'eau

$\Delta G_f^{298,15K} (i, gaz)$ ← **DIPPR** (base de données thermos)

disponible dans Simulis Thermodynamics

$$\Delta G_f^{298,15K} (i, DI) = \Delta G_f^{298,15K} (i, g) + \Delta G_{solvation}^{298,15K} (i)$$
$$\Delta G_r^{gaz}$$

Dans l'état gaz:

reactants $\rightleftharpoons$ produits

Dans l'eau:

reactants $\rightleftharpoons$ produits

$$\Delta G_r^{eau} = \Delta G_r^{gaz} + \Delta G_{solv}^{prod} - \Delta G_{solv}^{react}$$
$$\Delta G_r^{eau}$$

Etats de référence (2)

25

Propriétés de formation à DI dans l'eau

$$\Delta G_f^{298,15K} (i, gaz) \leftarrow$$

DIPPR (base de données thermos)

disponible dans **Simulis Thermodynamics**

$$\Delta G_f^{298,15K} (i, DI) = \Delta G_f^{298,15K} (i, g) + \Delta G_{solvation}^{298,15K} (i)$$

Methodologie utilisée

Enthalpie de formation (1)

26

Méthodologie utilisée

Ethane

Q.M

$$E_{\text{Gaz}} (\text{C}_2\text{H}_6)$$

Ethanol

w_{Gaz}^1

Q.M

$$E_{\text{Gaz}}^1 (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$$

w_{Gaz}^2

Q.M

$$E_{\text{Gaz}}^2 (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$$

$$E_{\text{Gaz}} (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \sum_j w_{\text{Gaz}}^j E_{\text{Gaz}}^j (\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$$

Enthalpie de formation (2)

27

Sur des molécules utilisées dans la régression

Enthalpie de formation (3)

28

Résultats en 100 % prédiction

Enthalpie libre de formation (1)

29

Sur des molécules utilisées dans la régression

Enthalpie libre de formation (2)

30

Résultats en 100 % prédiction

Modélisation du pK_a (1)

31

◇ COSMO-RS = Conductor-like Screening Model for **Real Solvents**

→ pK_a estimated from the linear free energy relationship (LFER) :

$$pK_a^{calc} = c_0 + c_1 (\Delta G_{diss}) = c_0 + c_1 (\Delta G_{neutral}^j - \Delta G_{ion}^j)$$

Method	pK _{a1}	pK _{a2}
ChemAxon	2.21	9.00
ACD/Labs	2.19	9.40
COSMO-RS	2.36	8.96
Exp.	2.09	8.81

Modélisation du pK_a (2)

32

Conclusion et perspectives

33

Aspect chimique

Interactions de longue portée (LR)

Représentation et prédiction des propriétés d'équilibre des milieux biologiques

Group contribution methods
Benson, Joback,
UNIFAC, ASOG, etc.

Interactions de courte portée (SR)

Données manquantes difficiles à mesurer

Simulation moléculaire (méthode COSMO-RS)

$$\Delta G_f^{298,15K}$$
$$\Delta H_f^{298,15K}$$

Equilibres chimiques

- dissociation
- Complexation
- Oxydo-réduction
- Etc.